

2024 年全国硕士研究生入学统一考试 数学（二）试题及答案

一、选择题：1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.

(1) 函数 $f(x) = |x|^{1-x}(x-2)$ 的第一类间断点的个数 ().

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

【答案】 C

(2) 函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1+t^3 \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ 确定, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] = ()$.

- (A) $2e$ (B) $\frac{4}{3}e$ (C) $\frac{2}{3}e$ (D) $\frac{e}{3}$

【答案】 B

(3) 设函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 dt$, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 ().

- (A) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为奇函数
(B) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数
(C) $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为偶函数
(D) $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数

【答案】 D

(4) 已知数列 $\{a_n\} (a_n \neq 0)$, 若 $\{a_n\}$ 发散, 则

- (A) $\{a_n + \frac{1}{a_n}\}$ 发散 (B) $\{a_n - \frac{1}{a_n}\}$ 发散
(C) $\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\}$ 发散 (D) $\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\}$ 发散

【答案】 D

(5) 设已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} ((x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}), & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$ 则函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处

- (A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微. (B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微.
(C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微. (D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微.

【答案】 C

(6) 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = (\quad)$.

- (A) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ (B) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$

【答案】 A

(7) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 给出以下三个命题:

1. 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
2. 若存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
3. 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在

其中真命题的个数为 ().

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【答案】 B

(8) 设 A 为三阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P^T A P = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $A = (\quad)$.

$$(A) \begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

【答案】 C

(9) A 为 4 阶矩阵,若 $A(A - A^*)=0$,且 A 与 A^* 可交换,则 $r(A)$ 可能为

- (A) 0 或 1 (B) 1 或 3
(C) 2 或 3 (D) 1 或 2

【答案】 D

(10) 设 A 、 B 为 2 阶矩阵,且 $AB = BA$,则“ A 有两个不相等的特征值”是“ B 可对角化”的 () .

- (A) 充分必要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

【答案】 B

二、填空题: 11~16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

(11) 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为

【答案】 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

(12) 设 $f(x,y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值点是

【答案】 $(1,1)$.

(13) 已知微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$, 满足 $y(1) = 0$ 的解为

【答案】 $y + \frac{\pi}{4} = \arctan(x + y)$.

(14) 函数 $f(x) = x^2(e^x + 1)$, 求 $f^{(5)}(x) =$

【答案】 $3!e$.

(15) 某物体以速度 $v(t) = t + k \sin \pi t$ 作直线运动, 若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的时间段内平均速度为 $\frac{5}{2}$, 则 $k =$

【答案】 $\frac{3}{2}\pi$.

(16) 设 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关, 且其中任意两个

向量均线性无关, 则 $ab =$

【答案】 -4 .

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分) 已知函数平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $xy = \frac{1}{3}$, $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$, $y = 3x$ 围成的平面区域, 计算 $\iint_D (1+x-y) dx dy$

【答案】 $\frac{8}{3} \ln 3$.

(18) (本题满分 12 分) 已知 $y(x)$ 满足 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$, 满足 $y(1) = 2, y'(1) = 6$.

(1) 利用变换 $x = e^t$ 将上述方程化为常系数线性方程, 并求 $y(x)$;

(2) 计算 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

【答案】 (1) $y(x) = 2x^3$; (2) $\frac{22}{5} \sqrt{3}$.

(19) (本题满分 12 分) 设 $t > 0$, 平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$, $x = t$, $x = 2t$ 及 x 轴

围成, D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值.

【答案】最大值为 $V(\ln 2) = \frac{\pi \ln 2}{16} + \frac{3\pi}{64}$.

(20) (本题满分 12 分) 已知 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$

满足 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$.

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(2) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式.

【答案】(1) $\frac{1}{25}$; (2) $f(u, v) = \frac{1}{25}uv - (u+1)e^{-u} + \frac{1}{50}v^2$.

(21) (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, 且 $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$. 证明:

(1) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$;

(2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0)+f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$.

【答案】(1) 泰勒公式在 0 和 1 处展开即可证明; (2) 由 (1) 的不等式两边积分即可证出.

(22) (本题满分 12 分)

已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, $Ax = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解, 但 $Ax = 0$ 与

$B^T x = 0$ 不同解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交变换 $x = Qy$, 使 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T B A x$ 为标准形.

$$\text{【答案】 (1) } a = 1, b = 2; \text{ (2) } Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{6} & \sqrt{2} & \sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{6} & \sqrt{2} & \sqrt{3} \\ 2 & 0 & 1 \\ \sqrt{6} & & \sqrt{3} \end{pmatrix}, f(x_1, x_2, x_3) = 6y_1^2.$$

在职研究生招生信息网是以报考在职研究生为主题的官方网站，主要提供在职硕士、在职博士、MBA、EMBA等类别的在职研究生招生简章、报考条件、报名时间、报名入口等招生信息，是报考在职研究生综合门户网站。

- [同等学力](#)
- [专业硕士](#)
- [国际硕士](#)
- [中外合办](#)
- [在职博士](#)
- [国际博士](#)
- [高级研修](#)
- [高端培训](#)

扫一扫，关注在职研究生在职信息网官方微信，及时获取招生资讯、报考常见问题、备考经验分享等信息！还有免费的人工在线答疑服务！



微信服务号



微信订阅号

在职研究生招生信息网 全国统一报名咨询电话：**40004-98986**

更多专业硕士免费备考资料下载，历年真题，考试大纲，大纲解析，复习指导等，应有尽有！

临床医学： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-143/>

英语一： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-138/>

数学二： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-132/>

工商管理： <https://www.eduego.com/shiti/8-0-0-134/>