

2023 年全国硕士研究生招生考试

临床医学综合能力（中医）试题

一、A型题：1~36 小题，每小题 1.5 分；37~81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 阴中求阳的理论依据是

A. 阴得阳制而不亢进	B. 阴得阳助而不凝滞
C. 阳得阴助而化无穷	D. 阴得阳进是除不竭
2. 根据五行生克，符合抑强扶弱原则的治法是

A. 温肾健脾	B. 滋肾养肝	C. 泻心清肝	D. 疏肝健脾
---------	---------	---------	---------
3. 《素问·上古天真论》中，男子五八的表现是

A. 筋骨隆盛	B. 发堕齿槁	C. 天癸竭	D. 面焦
---------	---------	--------	-------
4. 《素问·灵兰秘典论》三焦是

A. 受盛之官	B. 传导之官	C. 决渎之官	D. 州都之官
---------	---------	---------	---------
5. 噎家不可发汗的理论依据是

A. 气能生津	B. 津能载气	C. 精血同源	D. 津血同源
---------	---------	---------	---------
6. 络脉中最细小的是

A. 孙络	B. 别络	C. 浮络	D. 血络
-------	-------	-------	-------
7. 外感暑邪，症见口渴喜饮，气短乏力的病机是

A. 暑易夹湿，耗上心气	B. 暑伤脾胃，运化失职
C. 暑多夹湿，阻遏气机	D. 暑性升散，伤津耗气
8. 至虚有盛候，指的是

A. 邪气极度虚弱，正气抗盛，外现实象	B. 邪气太盛，气血内闭，外现虚象
C. 脏腑之气虚衰，气化无力，外现实象	D. 邪气炽盛，阴精大伤，外现虚象
9. 崩漏下血，色紫暗夹有血块者，治宜

A. 收涩止血	B. 益气之血	C. 温经止血	D. 化瘀止血
---------	---------	---------	---------
10. 不属于面色青与面色黑相同主病的是

A. 血瘀，寒证	B. 血瘀，惊风	C. 寒证，痛证	D. 血瘀，痛证
----------	----------	----------	----------
11. 可见里急后重表现的是

A. 湿热蕴脾	B. 寒湿困脾	C. 肠热腑实	D. 大肠湿热
---------	---------	---------	---------

12. 不属于燥苔主病的是
A. 热邪炽盛 B. 阴液亏耗 C. 湿邪内蕴 D. 气不化津
13. 属于暑淫证与火淫证相同表现的是
A. 发热恶寒，咽喉疼痛 B. 发热汗出，口渴尿黄
C. 发热恶寒，气短神疲 D. 痛肿疮疡，便秘尿黄
14. 不属于饮证临床表现的是
A. 泛吐清水 B. 头晕目眩
C. 胸闷心悸 D. 带下量多
15. 不属于血热证临床表现的是
A. 斑疹色紫黑 B. 反复出血，加有血块
C. 经血鲜红而质粘稠 D. 月经先期量多
16. 症见心悸心烦，失眠多梦，潮热颧红，舌红少津，脉细数，当属
A. 心阴虚 B. 心火亢盛 C. 小肠实热 D. 心肾不交
17. 根据《伤寒论》太阳病与少阳病同时出现者属于
A. 并病 B. 合病 C. 越经传 D. 循经传
18. 见于肝胆湿热而不见于湿热蕴脾证的表现是
A. 身目发黄 B. 舌苔黄腻 C. 口苦口黏 D. 阴部湿痒
19. 按照药性理论，治疗水肿，小便不利的药物大多具有的药味是
A. 涩 B. 淡 C. 咸 D. 苦
20. 治疗实热积滞，大便干结应选用的药物是
A. 决明子 B. 番泻叶 C. 虎杖 D. 芒硝
21. 附子肉桂功效的共同点是
A. 回阳救逆，温中止呕 B. 引火归元，温通经脉
C. 补火助阳，散寒止痛 D. 回阳通脉，温肺化饮
22. 下列驱虫药中性味苦辛温，归胃大肠经的是
A. 南瓜子 B. 鹤草芽 C. 槟榔 D. 槟榔
23. 朱砂多入丸散服用，其每日用量是
A. 0.015 ~ 0.03g B. 0.1 ~ 0.5g C. 1 ~ 2g D. 3 ~ 5g
24. 涩肠止泻宜煨用，敛肺清热，利咽开音，宜生用的药物是
A. 诃子 B. 五倍子 C. 五味子 D. 金樱子
25. 升麻具有的功效是
A. 透疹 B. 升阳止泻 C. 疏肝解郁 D. 生津止渴

26. 具有温肺豁痰利气，散结通络止痛功效的药物是
A. 白前 B. 细辛 C. 白芥子 D. 干姜
27. 既能疏肝行气解郁又能消食健脾和胃的药物
A. 玫瑰花 B. 佛手 C. 麦芽 D. 莱菔子
28. 羌活胜湿汤与大秦艽汤中均有的药物是
A. 苍术和独活 B. 川芎和防风 C. 藁本和防风 D. 细辛和甘草
29. 《杨氏家藏方》萆薢分清饮中含有而《医学心悟》中萆薢分清饮不含有有的药物是
A. 乌药、益智仁 B. 白术、石菖蒲 C. 茯苓、车前子 D. 肉桂、小茴香
30. 吴茱萸汤的功效是
A. 温中散寒，缓急止痛 B. 温中补虚，降逆止呕
C. 温中补气，和里缓急 D. 温中散寒，健脾止泻
31. 紫金锭和仙方活命饮均有的功效是
A. 清热解毒 B. 消肿止痛 C. 去腐生肌 D. 软坚散结
32. 注重气血双补，重在补气，使气旺血自生以养血宁神之效的方剂是
A. 归脾汤 B. 当归补血汤 C. 补中益气汤 D. 天王补心丹
33. 清上与泻下并行，但泻下的目的是为了清泄郁热的方剂是
A. 大承气汤 B. 黄连解毒汤 C. 凉膈散 D. 葛根芩连汤
34. 主治尿频，也可用治遗尿，遗精的方剂是
A. 金锁固精丸 B. 桑螵蛸散 C. 肾气丸 D. 右归丸
35. 主治妇人素有癥瘕而漏下不止，也可用治经闭或者产后恶露不尽而腹痛拒按的方剂是
A. 生化汤 B. 失笑散 C. 活络效灵丹 D. 桂枝茯苓丸
36. 临床应用四逆汤，症见四肢厥逆恶寒蜷卧，脉微而复自下利，利虽止而余症仍在者，宜加用
A. 葱白 B. 人参 C. 生姜汁 D. 猪胆汁
37. 女性，49岁。失眠4个月，心烦不寐，入睡困难，心悸多梦伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热咽干少津，舌红苔少，脉细数，宜选
A. 左金丸合酸枣仁汤 B. 杞菊地黄丸
C. 六味地黄丸合交泰丸 D. 天麻钩藤饮
38. 女性，34岁。咳嗽3个月，查胸片示：双下脚纹理增重、可逆阵作，胸胁胀痛，咽干口苦，痰少质粘，舌红苔薄黄，脉弦，其辨
A. 风燥伤肺证 B. 肺阴亏虚 C. 肝火犯肺 D. 肺热津伤

39. 女性，28岁一周前外感，恶寒发热，头身疼痛。刻下症见：咳嗽痰黄，喉中哮鸣，喘息气促，口干口渴，舌红苔黄腻，脉弦滑，宜选
A. 射干麻黄汤 B. 定喘汤
C. 小青龙加石膏汤 D. 三子养亲汤
40. 男性，55岁。平素头痛头晕，突然左侧半身不遂，舌强不语，神识欠清，痰多便秘，舌暗红苔黄腻，脉弦滑
A. 中风 风阳上扰证 B. 中风 痰热腑实证
C. 中风 痰火瘀闭证 D. 中风 痰浊瘀闭证
41. 女性，76岁。长期患病，久治不愈，刻下症见：眩晕耳鸣补肺益气，目干畏光，肢体麻木，急躁易怒，舌红苔少，脉细。治宜选用
A. 归脾汤 B. 沙参麦冬汤 C. 补肝汤 D. 左归饮
42. 男性，67岁，慢性支气管炎病史19年。刻下症见：呼吸浅短，张口抬肩，不能平卧，胸闷心悸，形寒汗出，腰膝酸软，小便短少，舌淡紫，脉沉细。其诊断是
A. 肺胀 痰浊壅肺证 B. 肺胀 肺肾气虚证
C. 肺胀 外寒里饮证 D. 肺胀 阳虚水泛证
43. 男性，74岁。前列腺增生病史10年。1个月来小便不畅，点滴而下，神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝冷重，舌淡胖，苔薄白，脉沉细。治法宜选用
A. 升清降浊，化气利水 B. 理气健脾，通阳利水
C. 益气行滞，化气利水 D. 温补肾阳，化气利水
44. 女性，63岁。昨日突发恶寒发热，头痛，项背强急，肢体酸重，四肢抽搐，舌苔薄白，脉浮紧。其诊断是
A. 头痛 外感风寒 B. 感冒 风寒表征
C. 痫病 风痰闭阻证 D. 痫证 邪壅经络证
45. 治疗痰饮的主要原则是
A. 攻逐 B. 渗利 C. 温化 D. 宣散
46. 男性，32岁。素喜辛辣饮食，昨日聚餐后吐血色红，夹有食物残渣，脘腹胀闷，口臭便秘，大便色黑，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用
A. 泻心汤合清胃散 B. 泻心汤合十灰散 C. 玉女煎合凉膈散 D. 玉女煎合黛蛤散
47. 女性，86岁，素有高血压26年，糖尿病21年，长期服药，刻下症见：胸闷气短，心悸而痛，动则更甚，倦怠自汗。舌淡胖，脉沉迟，治法宜用
A. 温经散寒，宣通心阳 B. 通阳泻浊，豁痰宣痹
C. 通阳宣痹，养心安神 D. 温补阳气，振奋心阳

48. 女性，28岁。分娩4个月后出现四肢沉重，肌肉关节酸痛，活动不利，舌淡苔白腻，脉濡。治宜选用
 A. 防风汤 B. 乌头汤 C. 宣痹汤 D. 薏苡仁汤
49. 女性，69岁。3个月来大便时溏时泻，进食油腻之物则加重，食后脘闷不舒，面色萎黄，舌淡苔白，脉弱。治法宜选用
 A. 疏肝健脾，去湿止泻 B. 补中益气，升阳止泻
 C. 健脾益气，化湿止泻 D. 健脾温肾，涩肠止泻
50. 女性，32岁。平素食欲不振，食后胃满不适。1周来恶心呕吐时作，神疲乏力，脘部痞闷，大便不畅，舌苔白滑，脉弱。治宜选用
 A. 理中汤加减 B. 香砂六君子汤加减
 C. 麦门冬汤加减 D. 藿香正气散加减
51. 女性，43岁。水肿多年，时轻时重，每于月经前水肿加重，3个月来水肿持续不退，面浮身肿，腰部刺痛，舌紫暗苔白，脉沉细。治宜选用
 A. 济生肾气丸合真武汤 B. 实脾散合防己黄芪汤
 C. 桃红四物汤合五苓散 D. 五皮饮合胃苓汤
52. 下列腧穴中，位于肘横纹下7寸的是
 A. 孔最 B. 偏历 C. 郄门 D. 支沟
53. 支沟主治而外关不主治的病症是
 A. 耳鸣 B. 目赤肿痛 C. 泄泻 D. 便秘
54. 下列腧穴中，宜针不宜灸的是
 A. 睛明 B. 气海 C. 大椎 D. 百会
55. 下列各组腧穴中，均可用治瘾疹、湿疹的是
 A. 阴陵泉、太溪 B. 阳陵泉、曲池 C. 曲池、血海 D. 列缺、血海
- (56~58题共用题干)
 男性，73岁。高血压病史10年，冠心病病史8年。3周前因受惊吓出现心悸不宁，不寐多梦，食少纳呆，舌淡苔薄白，脉弦细。
56. 治宜选用
 A. 朱砂安神丸 B. 柏子养心丸 C. 安神定志丸 D. 苏合香丸
57. 患者服药后病情好转。1周前因不慎受寒，出现胸闷胸痛，自汗气短，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉沉迟。应诊断为
 A. 心悸 瘀阻心脉证 B. 心悸 水饮凌心证
 C. 胸痹 寒凝心脉证 D. 胸痹 心肾阳虚证

58. 治宜选用

- A. 桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤 B. 参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤
C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤 D. 参附汤合右归饮

(59 ~ 61 题共用题干)

男性,23岁。发热7天,初起体温为38°C左右,逐渐升高至39.8°C,寒战,壮热不退,咳嗽气急,左侧胸部剧痛,咯吐大量黄绿色痰,自觉喉间有腥味,口干咽燥,舌红苔黄腻,脉洪数。

59. 其诊断是

- A. 肺痈初期 B. 肺痈成痈期 C. 肺痈溃脓期 D. 肺痈恢复期

60. 治法宜选用

- A. 疏风散热,清肺化痰 B. 排脓解毒
C. 清肺解毒,化瘀消痈 D. 清养补肺

61. 若治疗后患者身热渐退,痰量减少,食纳增加,自汗气短,舌红苔薄白,脉细。治宜首选

- A. 沙参清肺汤 B. 千金苇茎汤
C. 沙参麦冬汤 D. 加味桔梗汤

(62 ~ 64 题共用题干)

女性,47岁。5天前出现右胁部疼痛,牵引肩背,时有恶心呕吐,经服中、西药后疼痛减轻。一天前疼痛又加重,今晨出现身热恶寒,呕吐1次,特来就诊。就诊时右肋疼痛剧烈,牵引肩背,时有恶心呕吐,伴见高热,口干且苦,纳呆,食后作胀,大便不爽,小便黄赤。舌红,苔黄腻,脉弦数。

62. 其诊断为

- A. 胁痛 B. 呕吐 C. 便秘 D. 内伤发热

63. 其辨证为

- A. 邪郁少阳 B. 肝气郁结 C. 肝胆湿热 D. 肝脾不和

64. 治宜选用

- A. 小柴胡汤加减 B. 龙胆泻肝汤加减
C. 滋水清肝饮加减 D. 丹栀逍遥散加减

(65 ~ 67 题共用题干)

女性,30岁。近期劳累过度,于1周前出现黄疸。刻下症见:身目黄染,黄色鲜明,纳差,乏力,口干口苦,腹部胀满,大便秘结,小便短少黄赤,夜寐欠佳,舌红苔腻微黄,脉弦滑数。

65. 其病机是

- A. 湿热熏蒸，困遏脾胃，壅滞肝胆，胆汁泛溢
 B. 湿遏热伏，困阻中下二焦，胆汁外溢
 C. 肝肾阴虚，湿热留恋，肝失疏泄，胆汁泛溢
 D. 痰热互结，肝胃不和，胆汁外溢

66. 治法宜选用

- A. 清热化瘀，解毒退黄 B. 滋补肝肾，清热利湿
 C. 运脾化浊，清热利湿 D. 清热通腑，利湿退黄

67. 治宜选用

- A. 茵陈五苓散 B. 麻黄连翘赤小豆汤
 C. 茵陈蒿汤 D. 栀子清肝汤

(68 ~ 70 题共用题干)

女性，40岁。半年前因紧张劳累出现胃脘不适，时呕，其后每因情绪不畅而出现呕吐，嗳气，近日呕吐又作，吞酸口苦，舌淡红苔薄白，脉弦。

68. 针灸治疗除相应的募穴外，还应主取

- A. 手厥阴，足阳明经穴 B. 足厥阴，足少阳经穴
 C. 手厥阴，足太阴经穴 D. 足厥阴，足太阴经穴

69. 其主穴是

- A. 下脘，外关，太冲 B. 中脘，内关，足三里
 C. 梁丘，外关，阳陵泉 D. 上脘，内关，三阴交

70. 针对吞酸，应选用的穴位是

- A. 天枢、日月 B. 脘中、太白
 C. 大横、期门 D. 建里、公孙

(71 ~ 73 题共用题干)

女性，48岁。因右肩痛月余来诊。缓慢起病，疼痛逐渐加重。刻下以肩外侧为主，酸痛明显，肩关节外展困难，劳累加重。舌淡红，苔薄白，脉沉细。

71. 根据经络辨证，属于

- A. 手阳明经证 B. 手少阳经证 C. 手太阳经证 D. 手太阴经证

72. 治疗的主穴除肩髃、肩髎、阿是穴外，还应选用

- A. 昆仑 B. 足临泣 C. 条口 D. 阴陵泉

73. 除主穴外，还可配用

- A. 合谷、风池 B. 内关、膈俞 C. 列缺、关元 D. 足三里、气海

74. 医学专业是对公众所期待的责任有公开承诺的医学共同体，下列叙述不正确的是
- A. 医学专业不需要通过系统的训练
 - B. 医学专业要求专业共同体自律
 - C. 医学专业通过强制实施行业标准获得社会责任
 - D. 医学专业通过严格的准入制度以保持专业诚信
75. 下列叙述中，不属于医患关系中患者义务的是
- A. 患者负有保证就医诚实性的义务
 - B. 患者负有同意治疗后遵医的义务
 - C. 传染病患者有防止疾病进一步播散的义务
 - D. 患者负有遵循即使不必要的治疗的义务
76. 由于医患之间存在事实上的医学知识拥有的不平等，使患者处于脆弱并依赖医生的地位，相信医生在专业上是胜任的，会将患者的健康利益置于首位，这样的医患关系是
- A. 消费关系
 - B. 信托关系
 - C. 依附关系
 - D. 帮扶关系
77. 男性，35岁。因桡骨骨折行钢板内固定术，术后3个月钢板出现断裂，患者要求医院赔偿。院方不恰当的处理是
- A. 倾听患者抱怨，进行解释安抚
 - B. 详细了解钢板断裂的相关情况
 - C. 明确责任，给出解决方案
 - D. 告知属于钢板质量问题，医院不负责处理
78. 为患者保守秘密是重要的临床伦理原则，对患者医疗信息加以保护是医生的义务。下列医生的行为可以得到伦理学辩护的是
- A. 应保险公司要求向其提供可识别患者的任何医疗信息
 - B. 应公司经理要求向其提供有关患者个人医疗过程的信息
 - C. 应媒体要求向其提供有关患者医疗费用支付的信息
 - D. 应同行要求向其提供经授权的匿名化医学研究的信息
79. 关于获取手术知情同意的伦理要求，以下叙述不正确的是
- A. 知情同意的伦理要求体现了尊重患者自主性原则
 - B. 知情同意仅是获得患者对治疗同意的签字文件
 - C. 知情同意书中应阐明手术预期受益与可能的风险
 - D. 知情同意应当是一个医患之间坦诚交流的过程

80. 根据临床试验的伦理学原则，以下叙述正确的是
- 试验设计应使受试者和社会均受益
 - 试验设计应使受试者直接受益
 - 临床试验设计受益风险比应该合理
 - 受试者提出理由才允许其退出试验
81. 女性，23岁。妊娠7周，到某诊所要求做人工流产手术。诊所聘用人员王某为其进行了手术，术中患者出现大出血导致死亡。经查，王某为非医师行医，按照我国《医师法》相关规定，对其应适用
- 教育
 - 赔礼道歉
 - 警告
 - 依法追究刑事责任

二、B型题：82 ~ 105 小题，每小题 1.5 分，共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 痘位游移不定 B. 具有升散特点 C. 常兼它邪伤人 D. 发病急、变化快
82. 风性善行指的是
83. 风为百病之长指的是
- 治其标
 - 治其本
 - 标本同治
 - 本而标之
84. 《素问·标本病传论》指出“先病而后生中满者”宜
85. 《素问·标本病传论》指出“先热而后生中满者”宜
- 面色淡黄不泽
 - 面色淡黄而虚浮
 - 面色黄中透青
 - 面色晦暗如烟熏
86. 脾虚湿盛的病人多见
87. 寒湿困脾的病人多见
- 肾精不足证
 - 肾阳虚证
 - 肾阴虚证
 - 肾气不固证
88. 经闭不孕，发脱齿摇，耳鸣健忘者，其诊断是
89. 经闭不孕，眩晕耳鸣，潮热盗汗者，其诊断是
- 活血调经，利水
 - 通经下乳，利尿通淋
 - 活血调经，清热解毒
 - 通经下乳，舒筋活络
90. 益母草、牛膝功效的共同点是
91. 木通、王不留行功效的共同点是
- 木香
 - 沉香
 - 香附
 - 乌药
92. 既能行气止痛，又能温中止呕的药物是
93. 既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是

- A. 芍药 B. 半夏 C. 生姜 D. 甘草

94. 大柴胡汤含有而小柴胡汤不含有的药物是

95. 小陷胸汤含有而大陷胸汤不含有的药物是

- A. 阴血亏虚，风邪传里化热 B. 肝肾阴虚，虚火内扰
C. 温病后期，阴液耗伤 D. 肾阴亏虚，心火亢盛

96. 青蒿鳖甲汤主治证候的病因病机是

97. 秦艽鳖甲散主治证候的病因病机是

- A. 麻杏石甘汤 B. 桑菊饮 C. 清金化痰汤 D. 麻黄汤

98. 男性，27岁。隆冬时节，外出劳作，突发气喘，呼吸急促，咳嗽，痰多稀白，恶寒头痛，舌淡苔薄白，脉浮紧。治宜选用

99. 男性，42岁。盛夏时节，久吹空调，突发气喘，咯痰不爽，痰稠色黄，恶寒身热，无汗，舌红苔黄，脉浮滑而数。治宜选用

- A. 七福饮 B. 左归丸 C. 还少丹 D. 八珍汤

100. 痴呆属髓海不足证者，治宜选用

101. 痴呆属脾肾两虚证者，治宜选用

- A. 行痹 B. 着痹 C. 痛痹 D. 热痹

102. 选阿是穴、局部经穴、阴陵泉、足三里所治疗的病证是

103. 选阿是穴、局部经穴、膈俞、血海所治疗的病证是

- A. 库房、章门 B. 肾俞、天柱 C. 志室、秩边 D. 梁门、天枢

104. 以上各组腧穴中，均位于前正中线旁开2寸处的是

105. 以上各组腧穴中，均位于后正中线旁开3寸处的是

三、X型题：106 ~ 165 小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106. 下列叙述中，反映人体是一个有机整体的是

- A. 五脏一体 B. 左病治右，右病治左
C. 形神合一 D. “有诸内，必形诸外”

107. 下列选项中，与阴阳互根互用理论相关的是

- A. 阴病治阳 B. 阴胜则阳病
C. 阴损及阳 D. 阳中求阴

108. 下列选项中，属于脾升举功能失常的表现有
 A. 恶心呕吐 B. 腹部坠胀 C. 久泻脱肛 D. 皮下出血
109. 肺与肾的关系表现在
 A. 参与津液代谢 B. 推动血液运行
 C. 调节呼吸运动 D. 两脏阴液互滋
110. 下列关于营气的表述，正确的是
 A. 其性剽疾滑利 B. 酒陈于六腑
 C. 由水谷之精气化生 D. 和调于五脏
111. 下列有关十二别络的表述正确的是
 A. 与脏腑没有固定的属络关系
 B. 既有络穴又有所主病症
 C. 从四肢肘膝关节以下分出
 D. 在体表能沟通相表里的阴经和阳经
112. 依据《素问·五藏生成》“多食甘”可导致
 A. 骨节疼痛 B. 形体肥胖 C. 口唇干燥 D. 头发脱落
113. 下列有关“内燥”的表述，正确的是
 A. 发病多在秋季 B. 多因脏腑功能失常，津液亏少
 C. 病位多在肺胃及大肠 D. 临床多见津液枯涸，阴虚内热之证
114. 下列有关七情致病直接伤及内脏的叙述中正确的是
 A. 首先影响心神 B. 损伤相应内脏
 C. 数情交织，多伤心肝脾 D. 易损伤潜病之脏腑
115. 下列各项中，属于阳虚的治法是
 A. 阴病治阳 B. 阴中求阳 C. 益火之源 D. 寒者热之
116. 下列各项中可导致低热的
 A. 气虚 B. 饮停 C. 阴虚 D. 气郁
117. 下列各项中，属于脉象生理性质变异的是
 A. 六阴脉 B. 肥胖之人出现沉脉
 C. 秋季脉象稍浮 D. 脉出现在寸口的背侧
118. 可见于虚证的脉象有
 A. 细脉 B. 草脉 C. 动脉 D. 疾脉
119. 下列选项中，可导致强硬舌的有
 A. 寒凝筋脉 B. 热入心包 C. 风痰阻络 D. 热盛伤津

120. 下列各项中属于“反胃”的特征有
A. 朝食暮吐 B. 暮食朝吐 C. 食入即吐 D. 干呕无物
121. 下列选项中，属于表里同病的是
A. 恶寒发热，头身头痛，腹痛喜暖，呕吐泄泻
B. 胸中烦热，牙龈肿痛，腹痛喜暖，大便溏薄
C. 汗出恶风，鼻塞流涕，食少便溏，身体乏力
D. 发热恶寒，咽喉疼痛，喘咳汗出，便秘尿黄
122. 患者高热烦渴，下利不止，舌红苔黄脉数，因治疗不当，骤然出现冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝，属于
A. 热证转寒 B. 寒热错杂 C. 实证转虚 D. 真热假寒
123. 下列选项中属于肝肾阴虚表现的有
A. 头晕目眩 B. 耳鸣健忘 C. 失眠多梦 D. 月经量少
124. 胃阴虚证与胃火炽盛均可见的表现有
A. 胃脘疼痛 B. 便秘尿黄 C. 消谷善饥 D. 牙龈肿痛溃烂
125. 下列选项中，可见于脾不统血的有
A. 肌衄 B. 面色萎黄 C. 食少乏力 D. 月经过多
126. 下列药物中不能和甘草同用的是
A. 京大戟 B. 芫花 C. 昆布 D. 海藻
127. 治疗肺痈，可以使用的药物有
A. 芦根 B. 大血藤 C. 鱼腥草 D. 薏苡仁
128. 既利水又健脾的药物
A. 五加皮 B. 黄芪 C. 茯苓 D. 白术
129. 浙贝母的主治是
A. 风热咳嗽 B. 痰湿咳嗽 C. 痰热咳嗽 D. 寒痰咳嗽
130. 杜仲的功效是
A. 祛风湿 B. 补肝肾 C. 强筋骨 D. 安胎
131. 下列药物中，孕妇慎用的是
A. 肉桂 B. 瞿麦 C. 槟榔 D. 枳实
132. 下列治疗风湿热痹的药物有
A. 秦艽 B. 防己 C. 络石藤 D. 昆明山海棠
133. 三七与蒲黄皆主治的是
A. 胸腹刺痛 B. 血淋涩痛 C. 跌打损伤 D. 瘀滞出血

134. 牡蛎的主治
A. 遗精滑精 B. 惊悸失眠 C. 阴虚风动 D. 瘰疬癩瘤
135. 炉甘石的主治
A. 湿疮瘙痒 B. 溃疡不敛 C. 目赤翳障 D. 咽喉肿痛
136. “以法统方”内容包括
A. 以法组方 B. 以法谴方 C. 以法类方 D. 以法释方
137. 按功用或治法归类的方剂分类法
A. 七方 B. 八阵 C. 十种 D. 十剂
138. 清胃散中配伍升麻的用意
A. 宣透伏火 B. 清热解毒 C. 使滋阴不腻滞 D. 使泄火不凉遏
139. 下列各项中，属于川芎茶调散遣药组方依据的是
A. 外风宜散 B. 巍顶之上，唯风药可到
C. 疏养结合 D. 疏风防止过于温燥
140. 半夏与麦冬配伍，寓“去性存用”之意的方剂是
A. 麦门冬汤 B. 旋覆代赭汤 C. 清燥救肺汤 D. 竹叶石膏汤
141. 天麻钩藤饮与石斛夜光丸相同的治法有
A. 滋补肝肾 B. 平肝熄风 C. 清热凉血 D. 开窍化痰
142. 下列治疗自汗的方剂是
A. 桂枝汤 B. 牡蛎散 C. 玉屏风散 D. 补肺阿胶汤
143. 下列能补肺气，养肺阴，治疗久咳的方剂是
A. 九仙散 B. 生脉散 C. 百合固金汤 D. 养阴清肺汤
144. 以下属于桂枝汤的衍生方的是
A. 当归四逆汤 B. 黄芪桂枝五物汤
C. 小建中汤 D. 桂枝茯苓丸
145. 下列有关补阳还五汤治疗中风后遗症的叙述正确的是
A. 适用于气虚血瘀所致者 B. 黄芪用量宜大
C. 活血通络之品用量宜小 D. 需久服才能有效
146. 可用于厥证实证的治法有
A. 开窍醒神 B. 化痰辟秽 C. 理气解郁 D. 活血化瘀
147. 可应用归脾汤治疗的血证有
A. 鼻衄 属气血亏虚证 B. 吐血 属气虚血溢证
C. 便血 属脾胃虚寒证 D. 尿血 属脾不统血证

148. 下列各项中，与痹证相关的病理因素有
A. 风寒 B. 燥火 C. 湿热 D. 痰瘀
149. 泄泻与痢疾均有的临床特征是
A. 多发于夏秋季节 B. 感受外邪或内伤饮食发病
C. 病变部位涉及大肠 D. 大便次数增多，常有里急后重
150. 风寒感冒与风热感冒的鉴别要点有
A. 是否头痛 B. 是否咽痛 C. 是否流涕 D. 是否咳嗽
151. 辨别胃痛在气在血的鉴别要点有
A. 疼痛呈胀痛或刺痛 B. 疼痛部位游走或固定
C. 初病或久病 D. 食后疼痛是否加重
152. 下列各项中，适用于血淋辨证治疗的是
A. 小蓟饮子加减 B. 知柏地黄丸加减
C. 石韦散加减 D. 沉香散加减
153. 女性，46岁。喉结两旁出现结块3年，两周来又出现心悸不宁，心烦少寐，眼干多汗，手指颤动，舌红少苔，脉弦细数。治宜选用
A. 天王补心丹加减 B. 枳子清肝汤加减
C. 一贯煎加减 D. 消瘰丸加减
154. 内伤发热的治法为
A. 益气养血 B. 滋阴清热 C. 活血化瘀 D. 透营转气
155. 小青龙治痰饮病
A. 支饮 寒饮伏肺 B. 悬饮 脾肾阳虚
C. 悬饮 饮停胸胁 D. 溢饮 表寒里饮
156. 导致虚劳的原因
A. 精气不足，体质虚弱 B. 烦劳过度，损伤五脏
C. 失治误治，耗损精气 D. 大病久病，失于调理
157. 治疗实秘的常用治法有
A. 泻热导滞，润肠通便 B. 顺气导滞，降逆通便
C. 活血化瘀，行气通便 D. 润燥化痰，下气通便
158. 根据十四经腧穴主治规律，可以治疗神志病的是
A. 手三阳经穴 B. 足三阳经穴 C. 足三阴经穴 D. 任脉，督脉穴
159. 下列五输穴中，五行属水，为荥穴的有
A. 液门 B. 隐白 C. 少冲 D. 侠溪

160. 下列各组腧穴中，均不常用毫针浅刺的有
A. 心俞，少商 B. 太阳，阳陵泉 C. 肩髃，肩髎 D. 印堂，风门
161. 下列有关两穴之间距离的描述，正确的有
A. 尺泽至孔最为 5 寸 B. 大椎至百会为 10 寸
C. 条口至足三里为 5 寸 D. 少海至通里为 10 寸
162. 下列各项中，属于预防滞针措施的是
A. 针刺前做好解释工作 B. 行针避免单向捻转
C. 选穴宜少且手法宜轻 D. 避免压迫撞击针柄
163. 下列腧穴中，既是八脉交会穴又是络穴的有
A. 后溪 B. 内关 C. 公孙 D. 外关
164. 下列各组腧穴中，均属于足太阳膀胱经的是
A. 心俞、睛明 B. 至阴、次髎 C. 飞扬、悬钟 D. 申脉、秩边
165. 下列有关腧穴定位的叙述正确的是
A. 小海位于尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷中
B. 郄门位于腕掌侧远端横纹上 5 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间
C. 尺泽位于肘横纹上，肱二头肌腱桡侧凹陷中
D. 阳陵泉位于腓骨头后下方的凹陷中